

AVERTISSEMENTS AGRICOLES

DLP -9-3-72 286045

BULLETIN
TECHNIQUE
DES
STATIONS
D'AVERTISSEMENTS
AGRICOLES

PUBLICATION PÉRIODIQUE : 24 numéros par an

ÉDITION DE LA STATION DE BOURGOGNE

ABONNEMENT ANNUEL

ET FRANCHE-COMTÉ - 21, route de Seurre - 21 BEAUNE - Tél. 5.17 et 9.57

25 F.

COTE-D'OR - DOUBS - HAUTE-SAONE - JURA - SAONE-&-LOIRE - TERRITOIRE DE BELFORT - YONNE - NIÈVRE

Régisseur de recettes de la Direction Départementale de l'Agriculture - C. C. P. DIJON 3405.12 K

Bulletin n° 138 - Supplément n° 1 - Mars 1972

COLZA

GROS CHARANÇON DES TIGES

Favorisées par les températures diurnes exceptionnelles de fin Février, les premières sorties de gros charançon des tiges ont été observées dès le 26 avec des captures d'une certaine importance sur l'ensemble des zones de production de colza.

Le traitement est conseillé dans les secteurs habituellement infestés au début de la montaison du colza, c'est-à-dire lorsque la jeune tige atteint au moins 2 à 3 cm.

Parmi les insecticides actuellement homologués, le lindane, l'oléoparathion ou le parathion (lorsque la température est suffisante) doivent être employés à la dose minimale de 300 g. de matière active à l'hectare.

ARBRES FRUITIERS

TAVELURE DU POIRIER

Certaines variétés de poirier vont arriver aux stades C 3 - D dans les situations les plus avancées. Il est à craindre que lors des prochaines pluies des contaminations soient possibles à partir des conidies issues des pustules stromatiques de la tavelure sur rameau.

Il convient donc d'effectuer sur ces arbres un premier traitement cuprique à raison de 500 g. de cuivre métal par hl. de bouillie, traitement qui sera étendu successivement à tous les poiriers arrivant à ces stades sensibles.

ANTHONOIE DU POMMIER

C'est un petit charançon, long de 5 à 6 mm, de couleur noirâtre, couvert d'une fine pubescence grise avec à la partie postérieure des élytres, un dessin blanchâtre en forme de V.

Il est responsable dans certains vergers de la destruction des boutons floraux en dévorant le pistil et les étamines. Les pétales se dessèchent sans s'ouvrir et la fleur prend l'apparence d'un "clou de girofle".

Dans les régions habituellement contaminées, lorsque les arbres arrivent aux stades B ou C, utiliser une spécialité à base de lindane à 12 g. de matière active à l'hl. de bouillie.

Ces traitements peuvent être combinés avec ceux à base de bouillie cuprique (500 g. de cuivre) menés contre le chancre européen du pommier.

CULTURES LÉGUMIÈRES

Avec le réchauffement de la température, les premières colonies de pucerons sur laitues de chassis sont apparues. Surveiller les cultures et intervenir si nécessaire.

L'Ingénieur en Chef d'Agronomie
Chef de la Circonscription Phytosanitaire
"Bourgogne et Franche-Comté" :

Les Ingénieurs chargés
des Avertissements Agricoles :

J. PASIOT - M. MASSE

G. VAREL.

P368